

bulletin technique



FONGICIDE CONTRE
LA BRÛLURE
ALTERNARIENNE DANS
LES POMMES DE TERRE



BayerCropScience.ca ou 1 888-283-6847 ou communiquez
avec votre représentant de Bayer CropScience

Toujours lire et se conformer aux directives de l'étiquette. Scala® est une marque de
commerce de Bayer. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leurs
compagnies respectives. Bayer CropScience est membre de CropLife Canada.


Imprimé au Canada.
13141F-0210

Le saviez-vous?

SCALA^{MD} EST LE SEUL FONGICIDE DU GROUPE 9 QUI PROTÈGE CONTRE LA BRÛLURE ALTERNARIENNE DANS LES POMMES DE TERRE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Une protection supérieure contre la brûlure alternarienne
- Le seul fongicide du Groupe 9 – merveilleux pour bien gérer la résistance
- Une activité systémique locale qui protège la nouvelle croissance
- Un mouvement translaminaire qui protège les deux côtés de la feuille
- Homologué en application par voie de terre et par voie aérienne

MALADIES SUPPRIMÉS

- Brûlure alternarienne

CONSEILS RELIÉS À L'APPLICATION


- Délai de deux heures entre l'application et la pluie
- Un maximum de six applications par année
- Doit être mélangé en réservoir avec la dose homologuée de Bravo^{MD} (se conformer au mode d'emploi de l'étiquette de Bravo)• Toutes les parties du plant doivent être bien recouvertes pour obtenir un bon contrôle des maladies
- Ne pas appliquer plus que 4.5 L/ha (1.82 L/ac.) de fongicide au courant de la même saison de croissance
- Le blé peut être semé 30 jours après l'application, – respecter un délai de 130 jours pour semer toutes les autres cultures
- Éviter d'effectuer des applications consécutives de Scala ou d'autres fongicides du groupe 9. Alternier les applications avec des fongicides dotés de différents modes d'action.

DOSES D'APPLICATION, MOMENT PROPICE POUR L'APPLICATION ET DÉLAI DE PRÉ-RÉCOLTE

Doses	Moment pour l'application	Délai de pré-récolte
0.75 L/ha (0.3 L/ac.) de Scala + Bravo aux doses recommandées	Appliquer Scala + Bravo dans le cadre de votre programme de pulvérisation quand vous auriez habituellement appliqué votre produit spécifique pour la brûlure alternarienne. Appliquer lorsque les conditions climatiques sont favorables au développement de la maladie. Répéter les applications à intervalles de 7-14 jours ou lorsque nécessaire afin de maintenir le contrôle des maladies. En présence de conditions très favorables à la maladie, pulvériser à intervalles de 7 jours.	7 jours

FORMULATION ET EMBALLAGE

- Formulation 400 g/L suspension liquide
- Disponible en contenants de 2 L de 6.7 L



Un mouvement systémique local et translaminaire protège les deux côtés de la feuille et la nouvelle croissance